

Instrucciones de preparación para la colonoscopia MiraLAX

ES MUY IMPORTANTE QUE SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. A

¡NO SE PUEDE REALIZAR UNA COLONOSCOPIA COMPLETA EN UN COLON SUCIO!

ARTÍCULOS PARA COMPRAR SIN RECURSO

- Polvo MiraLax (botella de 238 gramos) - 14 dosis en total (porción de 17 g)
 - Puede comprar la botella (cada tapón es una dosis única de 17 g) o paquetes individuales
- Tabletas de bisacodilo (Dulcolax). Necesitará cuatro tabletas de bisacodilo de 5 mg. (Los genéricos están bien)
- 64 oz de Gatorade/Powerade o una bebida transparente de hidratación deportiva similar (preferida por su contenido de electrolitos).
 - (Sin tinte rojo o morado)
- 125 mg de simeticona (Gas-X)

ANTICOAGULANTES

- 5 días antes de su examen, deje de tomar Plavix (clopidogrel), Coumadin (warfarina), Brilinta (Ticagrelor) y Effient (prasugrel)
- 2 días antes de su examen, deje de tomar Pradaxa (Dabigatran), Xarelto (Rivaroxaban) y Eliquis (Apixaban)
- Consulte con el médico que le recetó la suspensión de estos medicamentos.

MEDICAMENTOS PARA LA DIABETICA/PERDIDA DE PESO

- Si toma Ozempic, Mounjaro, Trulicity, Victoza u otros agonistas de GLP1
 - Inyecciones: no tomar una semana antes del procedimiento
 - Oral: deje de tomar el día antes del procedimiento
- Si toma Ozempic, Mounjaro, Trulicity, Victoza u otro agonista de GLP1, NO debe consumir ALIMENTOS SÓLIDOS AL MENOS 24 HORAS para TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
- Si está tomando lo anterior o insulina para el control de la diabetes, comuníquese con su médico sobre cómo administrar sus medicamentos antes de la colonoscopia.

3 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

- Evite los suplementos de aceite de pescado, las nueces, las semillas, el pan integral, los frijoles, el maíz, las verduras crudas o las frutas con semillas, o la piel, ya que pueden influir negativamente en la calidad de su examen.

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA

2 DÍAS ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

- Puede comer una cena normal, pero dejar de comer alimentos sólidos después de las 7:00 p. m.
- Puede continuar bebiendo líquidos CLAROS. Esto significa líquidos a través de los cuales se puede ver, como agua, caldo claro sopas, gelatina, jugo de manzana, café (SIN CREMA), té, bebidas deportivas, refrescos transparentes y paletas heladas (sin trozos).
NO beba leche o productos de pulpa. Evite cualquier cosa con líquidos/tintes rojos/morados.

1 DÍA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

- Continúe tomando líquidos claros. Nada de alimentos sólidos hasta DESPUÉS del procedimiento. ¡Mantente hidratado!
- A las 12:00 pm (mediodía) tome las cuatro tabletas de Bisacodyl de 5 mg.
- A las 6:00 pm, mezcle las 14 dosis (cada dosis de 17 g) de MiraLAX con 64 oz de líquido transparente. Agite la solución hasta que la MiraLAX se ha disuelto. Luego beba un vaso de 8 oz de la solución cada 10-15 minutos hasta que la mitad de la solución desaparece (48 oz) en 2 horas. Si tiene náuseas, es posible que deba reducir el ritmo al que bebe. Ponga la solución restante de MiraLAX en el refrigerador. Puede seguir bebiendo líquidos claros o agua para mantenerse hidratado.
- A las 6:00 p. m., tome 125 mg de simeticona (Gas-X) cada 6 horas hasta el procedimiento. (Esto puede ayudar a aliviar molestias por gases/hinchazón antes y después del procedimiento).

EL DÍA DE TU PROCEDIMIENTO:

- 5-6 HORAS ANTES DE LA HORA DE SU PROCEDIMIENTO, termine de beber la solución MiraLAX dentro de las 2 horas. Esto puede exigirle que se levante en medio de la noche; sin embargo, es necesario ya que las heces se acumulan rápidamente (incluso si no se está comiendo nada) e interfiere con el examen de manera muy significativa.
- Cuando se haya acabado todo el Miralax, siga bebiendo líquidos claros hasta 3 horas antes de la hora de inicio de su procedimiento luego DETENGA TODOS LOS LÍQUIDOS. Hay que insistir en este tiempo de “nada por la boca” por la seguridad del paciente, su estómago debe estar completamente vacío en el momento del procedimiento.
- Si tiene diabetes, controle su nivel de azúcar en la sangre antes de presentarse para su examen y traiga la lectura con usted.
- Retenga toda la insulina de acción corta (como Humalog, Novalog, Apidra, etc.) el día del procedimiento. si no estás seguro de su medicamento de insulina, consulte a su proveedor de atención primaria/médico que le recetó para que le aconseje cómo administrar estos medicamentos.
- Puede tomar sus medicamentos habituales (excepto anticoagulantes o medicamentos para bajar de peso). Cualquier medicamento tomado el día de su el procedimiento se puede tomar con un pequeño sorbo de agua, AL MENOS 4 HORAS ANTES DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO TIEMPO.

Puede aplicar óxido de zinc o vaselina alrededor del ano para evitar la irritación de la preparación. Toallitas para bebé o pañales para adultos pueden ser considerados.

OTRA INFORMACIÓN

- Debe tener a alguien disponible para llevarlo a casa después de su procedimiento. Si planea tomar un taxi a casa, la estadía puede extenderse un poco. Por ley, no puede conducir el resto del día de la colonoscopia.
- Puede recibir hasta 4 facturas separadas: 1-centro, 2-médico, 3-patología y 4-anestesia.
- Use ropa cómoda. Traiga sus anteojos, audífonos, inhalador y tarjetas de seguro. Evite llevar objetos de valor. Esperamos el pago de copagos, coseguros y deducibles en el momento del servicio.
- Si debe cancelar o reprogramar su procedimiento, debe avisar con 3 días hábiles completos de anticipación. De lo contrario, se le cobrará una tarifa de cancelación de \$100.
- Las preguntas adicionales sobre su seguro deben dirigirse a su proveedor de seguros.
- Hay información adicional disponible en nuestro sitio web: www.utahendocenter.com